






Vacuna Bexsero

Información de la vacuna frente al meningococo B

Es una **infección bacteriana** provocada por el meningococo que, cuando se activa, puede producir meningitis (inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal). Esta es una enfermedad de **baja incidencia**, raramente se produce enfermedad meningocócica y **actualmente no hay ningún brote ni epidemia activa**.



DOSIS RECOMENDADAS

 GRUPO DE EDAD	 Inmunización primaria	 Intervalo entre dosis primarias	 Dosis de recuerdo
Lactantes de 2 a 3 meses de edad ^a	3 DOSIS	> 1 mes	1 dosis entre los 12 y 15 meses de edad (intervalo desde la última de la primovacuna: no menos de 6 meses) ^b
Lactantes de 3 a 5 meses de edad Nueva pauta: 2+1	2 DOSIS	> 2 mes	
Lactantes no vacunados de 6 a 11 meses de edad	2 DOSIS	≥ 2 meses	1 dosis en el segundo año de vida con un intervalo de al menos dos meses entre la primovacuna y la dosis de recuerdo.
Lactantes no vacunados de 12 a 23 meses de edad			1 dosis con un intervalo de 12 a 23 meses entre la primovacuna y la dosis de recuerdo.
Niños de 2 años a 10 años de edad	2 DOSIS	≥ 1 mes	No se ha establecido^d
Adolescentes (desde 11 años de edad) y adultos ^c			

Diseño: MICOE

(a) La 1ª dosis no antes de los 2 meses de edad. La seguridad y eficacia de Bexsero en lactantes de menos de 8 semanas no se ha establecido.
 (b) En caso de retraso en la administración, la dosis de refuerzo no debería administrarse después de los 24 meses de edad.
 (c) No hay información en adultos de más de 50 años de edad.
 (d) La necesidad de dosis de refuerzo no ha sido establecida.