


Vacunación
frente a **COVID-19**

Yo me vacuno,
por mí y por todos

¿Qué se espera tras la administración de las vacunas frente a la COVID-19?

Las vacunas de la COVID-19 nos proporcionarán la deseada inmunidad frente a la enfermedad pero, al igual que cualquier otra vacuna o medicamento, pueden producir **reacciones adversas**. Estas reacciones son, por lo general, de **intensidad leve o moderada** y se resuelven en un **plazo de pocos días** tras la vacunación.

¿Cuáles son las **reacciones adversas más frecuentes** tras la vacunación frente a COVID-19?



Dolor, hinchazón y enrojecimiento en el punto de inyección



Fiebre



Fatiga



Escalofríos



Cefalea



Dolor muscular y articular



Náuseas


¿Qué hacer en estos casos?



Si siente **dolor en el lugar de inyección**, la aplicación de frío local puede ayudarle. Coloque una compresa fría sobre la zona afectada y ejercite o mueva el brazo.



Si le sube la **fiebre**, es importante beber abundante líquido y no abrigarse demasiado para favorecer la pérdida de calor.




En estos casos, puede tomarse un **analgésico antitérmico**.




Recuerde que puede desarrollar fiebre tras la 1ª o posteriores dosis de la vacuna y que debe consultar al médico si se mantiene más allá de **24-48 horas**.



¿Cuándo contactar con el médico?

→  En caso de que **no note mejoría en unos pocos días.**

→  Si aparecen otros **síntomas más graves** que puedan estar relacionados con la vacunación frente a COVID-19.


Es importante saber que...

- ✓ La mayoría de las **reacciones adversas** comunicadas tras la vacunación **son leves y transitorias.**
- ✓ Hasta ahora, no se ha identificado **ninguna reacción adversa desconocida** que pueda ser **motivo de preocupación** entre la población.
- ✓ Para garantizar la protección frente a la enfermedad, debe recibir las **dosis necesarias** de la vacuna. En caso de que se haya administrado la primera dosis, el **padecer los síntomas descritos no contraindica la administración de la segunda**, salvo que su médico se lo indique.

Y recuerde...


seguir haciendo uso de las medidas de prevención, aunque esté vacunado.


Por su seguridad, por la de todos.





6M frente a COVID-19:

6M


 **M**ascarilla todo el tiempo posible

 **M**aximizar ventilación y fomentar actividades al aire libre

 **M**anos: lavarlas con frecuencia

 **M**inimizar los contactos

 **M**antener la distancia de seguridad

 **M**e quedo en casa si tengo síntomas, he dado positivo o he estado en contacto con algún caso confirmado